

THÔNG BÁO

V/v tái đàn lợn sau khí xảy ra dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Hiện nay, dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) có chiều hướng giảm; đặc biệt hiện nay đã có vắc xin (DTLCP) để tiêm phòng cho đàn lợn; nhiều thôn dịch bệnh DTLCP qua 30 ngày kể từ ngày con lợn bị dịch bệnh chết cuối cùng và chưa có dịch tái phát, cơ bản bảo đảm yêu cầu để tái đàn. Tuy nhiên vì rút DTLCP có khả năng tồn tại trong môi trường chăn nuôi và trong sản phẩm của lợn là rất lâu. Vì vậy áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp chính là chăn nuôi an toàn sinh học và tiêm phòng vắc xin DTLCP. UBND xã Hành Đức thông báo hướng dẫn quy định, các biện pháp kỹ thuật tái đàn lợn sau khi xảy ra dịch bệnh DTLCP cụ thể như sau:

1. Nguyên tắc tái đàn lợn

- Nuôi tái đàn lợn tại cơ sở chăn nuôi lợn chưa bị dịch bệnh DTLCP hoặc đã bị dịch nhưng đã qua 30 ngày không tái phát bệnh DTLCP; đảm bảo an toàn dịch bệnh.

- Chủ vật nuôi phải áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp cách ly, vệ sinh sát trùng bằng hóa chất, bằng vôi, nâng cao cỏ vật chất, dụng cụ chăn nuôi bảo đảm để áp dụng có hiệu quả các biện pháp an toàn sinh học.

- Được cơ quan chuyên môn, thú y địa phương kiểm tra, xác nhận đáp ứng đủ yêu cầu nuôi tái đàn.

- Kê khai với chính quyền địa phương trước khi thực hiện nuôi tái đàn lợn (làm bản cam kết chăn nuôi an toàn thực hiện theo Nghị định số 02/2021/NĐ-CP ngày 09/01/2017), trường hợp không kê khai và để xảy ra dịch bệnh thì bị xử lý theo quy định và không được hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

2. Thời gian thực hiện tái đàn

Thời điểm tái đàn sau dịch là 30 ngày kể từ khi tiêu hủy lợn hoặc sản phẩm lợn bị nhiễm bệnh và đã thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

3. Chuồng trại chăn nuôi

- Đối với chăn nuôi nhỏ lẻ hộ gia đình: Chuồng nuôi cần được đặt ở vị trí cao, đảm bảo ẩm áp về mùa đông, thoáng mát về mùa hè; thực hiện nuôi nhốt, không nuôi thả rông, không nuôi nhốt dưới nhà sàn, phải tách biệt với khu vực

sinh hoạt của gia đình và dân cư xung quanh; thuận tiện cho việc chăm sóc, đi lại, vận chuyển, thu gom xử lý chất thải, vệ sinh khu vực chăn nuôi.

- Đối với chăn nuôi quy mô gia trại, trang trại: Có tường, hàng rào ngăn cách với các khu vực khác, không bố trí nhiều loài vật nuôi vào cùng một nơi; tại lối ra vào chuồng nuôi phải có hố khử trùng, thay bảo hộ cho người ra, vào khu vực chăn nuôi.

4. Nguồn gốc con giống

Con giống trong tái đàn có thể nuôi phát triển giống lợn địa phương (lợn sóc); con lai giữa lợn địa phương với lợn lai Yorkshire, Landrace, Duroc... tùy theo điều kiện, quy mô chăn nuôi. Động vật nhập về nuôi phải có nguồn gốc rõ ràng, khỏe mạnh; có kết quả xét nghiệm âm tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (trường hợp lợn xuất phát từ vùng dịch). Trường hợp lợn nhập về có nguồn gốc từ địa bàn tỉnh khác, ngoài yêu cầu kiểm tra âm tính với mầm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, lợn phải được kiểm dịch và có Giấy chứng nhận kiểm dịch theo quy định tại Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn. Trước khi nhập đàn, nuôi cách ly ít nhất 02 tuần.

5. Quản lý dịch bệnh

- Thường xuyên theo dõi sức khỏe đàn vật nuôi, khi phát hiện con vật nghi bệnh, bị bệnh phải được cách ly ngay để tránh phát tán bệnh trong chuồng nuôi, ngăn chặn không cho mầm bệnh phát tán ra ngoài và truyền đi nơi khác bằng cách không buôn bán, vận chuyển, giết mổ...; hạn chế người, phương tiện ra vào khu vực có lợn mắc bệnh.

- Việc chấp hành tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm là quy định bắt buộc của Nhà Nước đối với mỗi cá nhân, hộ gia đình có chăn nuôi gia súc, gia cầm; Các trường hợp không chấp hành quy định tiêm phòng, làm phát sinh dịch bệnh nguy hiểm ở gia súc, gia cầm trên địa bàn xã phải chịu trách nhiệm trước pháp Luật thú y

Yêu cầu các bộ phận chuyên môn có liên quan và các hộ gia đình triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo này./.

Nơi nhận:

- 5 thôn trưởng
- Đài truyền thanh
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Văn Thanh